

Ausführungsbestimmungen betreffend die Anwendung verschreibungspflichtiger Arzneimittel

vom 2. Dezember 2019 (Stand 1. Januar 2020)

Die Gesundheits- und Sozialdirektion,

gestützt auf Art. 83 Abs. 2 des Gesetzes vom 30. Mai 2007 zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit (Gesundheitsgesetz, GesG)¹⁾, in Ausführung von Art. 52 Abs. 2 und 3 der Verordnung vom 21. September 2018 über die Arzneimittel (Arzneimittelverordnung, VAM)²⁾,

beschliesst:

§ 1 Geltungsbereich

¹ Diese Ausführungsbestimmungen gelten für Fachleute mit eidgenössisch anerkannter Ausbildung gemäss Art. 52 Abs. 2 VAM³⁾, die im Rahmen ihrer Berufsausübung verschreibungspflichtige Arzneimittel eigenverantwortlich anwenden.

§ 2 Bachelor of Science FH in Hebamme

¹ Fachleute mit Bachelor of Science FH in Hebamme sind berechtigt, folgende Arzneimittel anzuwenden:

Therapeutische Gruppe	Wirkstoffe	Bemerkungen
Analgetika Antipyretika Nichtsteroidale Anti-phlogistika	Paracetamol, Ibuprofen, Mefenaminsäure, Diclofenac, Tramadol	Analgesie unter der Geburt/Nachwehen, Dammschmerz, Nahtschmerz
Anaphylaktischer Schock	Adrenalin Auto-Injektor 0.3mg	Anaphylaktischer Schock
Antiemetika Prokinetika	Metoclopramid	

¹⁾ NG 711.1

²⁾ NG 812.212.21

³⁾ NG 812.212.21

Therapeutische Gruppe	Wirkstoffe	Bemerkungen
Antihaemorrhoidalia	Alle inkl. kortikoidhaltige	
Antinfektiva	Amoxicillin, Clavulansäure-Amoxicillin, Penicillin-G (Benzylpenicillin)	Limitatio: Ausschliesslich bei pränatalem positivem Streptokokken B Befund. Bei vorzeitigem Blasensprung und SSW > 37 SSW
Antinfektiva	Cefazolin, Clindamycin	Bei Penicillinallergie
Antikoagulation	Niedermolekulare Heparine	Bei starken Varizen
Antimykotika	Nystatin cutan	Soor an der Brust/Windeldermatitis
Immunglobuline	Humanes Anti-D Immunglobulin	Prophylaxe der Rhesusimmunisierung
Infundibilia	NaCl 0.9%	Trägerlösung Mittel der Wahl
Infundibilia	Glucose 5% Ringer-Lactat	Volumenersatz
Laktationshemmer	Cabergolin, Bromocriptin	
Lokalanästhetika	Lidocain (inkl. Parenteralia), Xylocain	Mittel der Wahl zur Versorgung von Risswunden oder Episiotomien Anwendung nur durch Hebammen mit Bewilligung zum Dammschnitt

Therapeutische Gruppe	Wirkstoffe	Bemerkungen
Spasmolytika	Scopolaminbutylbromid (inkl. Parenteralia)	Rigider Muttermund; Achtung Tachykardie bei i.v. Gabe, deshalb keine i.v. Anwendung nach PDA, bei schweren variablen Dezele-rationen im CTG und innerhalb von 30 Min. nach Gabe von Gynipral®
Tokolytika	Hexoprenalin	Wehenhemmer
Uterotonika	Oxytocin	Zur Lösung der Nach-geburt Blutung in der Placentar- bzw. Post-placentarphase
Vitamine	Vitamin K	Blutungsprophylaxe beim Neugeborenen

§ 3 Aufhebung bisherigen Rechts

¹ Die Ausführungsbestimmungen vom 30. November 2011 betreffend die Anwendung verschreibungspflichtiger Arzneimittel gemäss Art. 27a Arzneimittelverordnung⁴⁾ werden aufgehoben.

§ 4 Inkrafttreten

¹ Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft.

⁴⁾ A 2011, 1697

Änderungstabelle - Nach Beschluss

Beschluss	Inkrafttreten	Element	Änderung	Fundstelle
02.12.2019	01.01.2020	Erlass	Erstfassung	A 2019, 2133

Änderungstabelle - Nach Artikel

Element	Beschluss	Inkrafttreten	Änderung	Fundstelle
Erlass	02.12.2019	01.01.2020	Erstfassung	A 2019, 2133