

## Ausführungsbestimmungen betreffend die Anwendung verschreibungspflichtiger Arzneimittel

vom 2. Dezember 2019<sup>1</sup>

Die Gesundheits- und Sozialdirektion,  
gestützt auf Art. 83 Abs. 2 des Gesetzes vom 30. Mai 2007 zur Erhaltung  
und Förderung der Gesundheit (Gesundheitsgesetz, GesG)<sup>2</sup>, in Ausfüh-  
rung von Art. 52 Abs. 2 und 3 der Verordnung vom 21. September 2018  
über die Arzneimittel (Arzneimittelverordnung, VAM)<sup>3</sup>

beschliesst:

### § 1 Geltungsbereich

Diese Ausführungsbestimmungen gelten für Fachleute mit eidgenössisch  
anerkannter Ausbildung gemäss Art. 52 Abs. 2 VAM<sup>3</sup>, die im Rahmen  
ihrer Berufsausübung verschreibungspflichtige Arzneimittel eigenverant-  
wortlich anwenden.

### § 2 Bachelor of Science FH in Hebamme

Fachleute mit Bachelor of Science FH in Hebamme sind berechtigt, fol-  
gende Arzneimittel anzuwenden:

Therapeutische Gruppe	Wirkstoffe	Bemerkungen
Analgetika Antipyretika  Nichtsteroidale An- tiphlogistika	Paracetamol, Ibuprofen, Mefenaminsäure, Di- clofenac, Tramadol	Analgesie unter der Geburt/Nachwehen, Dammerschmerz, Naht- schmerz
Anaphylaktischer Schock	Adrenalin Auto-Injektor 0.3mg	Anaphylaktischer Schock
Antiemetika Prokinetika	Metoclopramid	
Antihaemorrhoidalia	Alle inkl. kortikoidhaltige	

Antinfektiva	Amoxicillin, Clavulansäure-Amoxicillin, Penicillin-G (Benzylpenicillin)	Limitatio: Ausschliesslich bei pränatalem positivem Streptokokken B Befund. Bei vorzeitigem Blasensprung und SSW > 37 SSW
	Cefazolin, Clindamycin	Bei Penicillinallergie
Antikoagulation	Niedermolekulare Heparine	Bei starken Varizen
Antimykotika	Nystatin cutan	Soor an der Brust/Windeldermatitis
Immunglobuline	Humanes Anti-D Immunglobulin	Prophylaxe der Rhesusimmunisierung
Infundibilia	NaCl 0.9%	Trägerlösung Mittel der Wahl
	Glucose 5% Ringer-Lactat	Volumenersatz
Laktationshemmer	Cabergolin, Bromocriptin	
Lokalanästhetika	Lidocain (inkl. Parenteralia), Xylocain	Mittel der Wahl zur Versorgung von Risswunden oder Episiotomien  Anwendung nur durch Hebammen mit Bewilligung zum Dammschnitt
Spasmolytika	Scopolaminbutylbromid (inkl. Parenteralia)	Rigider Muttermund; Achtung Tachykardie bei i.v. Gabe, deshalb keine i.v. Anwendung nach PDA, bei schweren variablen Dezelektionen im CTG und innerhalb von 30 Min. nach Gabe von Gynipral®

Tokolytika	Hexoprenalin	Wehenhemmer
Uterotonika	Oxytocin	Zur Lösung der Nachgeburt Blutung in der Placental- bzw. Postplacentalphase
Vitamine	Vitamin K	Blutungsprophylaxe beim Neugeborenen

### § 3 **Aufhebung bisherigen Rechts**

Die Ausführungsbestimmungen vom 30. November 2011 betreffend die Anwendung verschreibungspflichtiger Arzneimittel gemäss Art. 27a Arzneimittelverordnung<sup>4</sup> werden aufgehoben.

### § 4 **Inkrafttreten**

Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft.

---

<sup>1</sup> A 2019, 2133

<sup>2</sup> NG 711.1

<sup>3</sup> NG 812.212.21

<sup>4</sup> A 2011, 1697